

Cómo retirar la bomba para el dolor

La bomba para el dolor se usa después de una cirugía para suministrar un medicamento para adormecer directamente el área cerca de la incisión para que tenga menos dolor. Recibe el medicamento durante 2 o 4 días.


El medicamento fluye de manera constante y muy lentamente desde la bomba a través de un pequeño tubo colocado debajo de la piel.

Cuando la bomba está vacía, se retira el tubo y se desechan la bomba y el tubo.



Se usa una pequeña bolsa para colocar la bomba a fin de que pueda realizar sus actividades diarias.

Partes de la bomba para el dolor



La bomba le suministra un medicamento para adormecer a la velocidad ordenada por su cirujano. La velocidad de la bomba no puede modificarse.

Un pequeño tubo, denominado catéter, se conecta a la bomba.

También, se colocan una abrazadera y un filtro junto con el tubo.

Cómo saber si la bomba funciona

- El área de la cirugía se siente adormecida y el medicamento reduce el dolor.
- El tamaño de la bola gradualmente se reduce y la bolsa exterior en la bomba queda más suelta y comienza a arrugarse.
- La bomba está vacía cuando la bolsa se ve plana y usted siente un tubo duro en el medio. Generalmente, esto tarda entre 48 y 72 horas.



Cómo realizar el mantenimiento de la bomba

- Revise su bomba para el dolor varias veces al día para asegurarse de que la abrazadera esté abierta y se deslice fácilmente, que nada cubra el filtro y que el tubo no esté curvado ni doblado.
- Proteja la bomba, el filtro y el tubo del agua. Siga las instrucciones del cirujano con respecto a bañarse.
- Cuando duerme, mantenga la bomba dentro de la bolsa y colóquela junto a usted arriba de las sábanas.



Cierre la abrazadera y llame a su cirujano si:

- Detecta que la bomba o el tubo pierden.
- El tubo se separa de la bomba. NO vuelva a conectarlo.
- El tubo se separa de la bomba. NO vuelva a conectarlo.



No:

- Tome un baño de inmersión ni coloque la bomba bajo agua.
- Coloque la bomba debajo de las sábanas, en el piso o colgando de algo.

Cómo retirar la bomba


Siga estos pasos para quitar la bomba para el dolor.

Usted necesitará lo siguiente:

- Una vendaje adhesivo
- Una bolsa de residuos


Paso 1

Lave sus manos con agua y jabón y luego séquelas.



Paso 2

- Afloje suavemente el vendaje alrededor del sitio donde el tubo ingresa en la piel.
- Despéguelo lentamente y retírelo.




Paso 3

Quite la cinta que se usa para sostener el tubo en su lugar.


Paso 4

- Mantenga el tubo junto a la piel y suavemente jale del tubo en un ángulo de 90 grados.
- Si le cuesta sacarlo o si se estira, deténgase y llame a su cirujano. Si continúa jalando, se podría romper el tubo.



Paso 5

Después de quitar el tubo, revise que en la punta haya una marca negra para asegurarse de que haya retirado el tubo entero.




Paso 6

Cubra el sitio donde estaba el tubo con un vendaje adhesivo.

Paso 7


Deseche el tubo, la bomba y los vendajes en la bolsa de residuos.



Cómo revisar el sitio de entrada del tubo al siguiente día

Paso 1

Lave sus manos con agua y jabón y luego séquelas.



Paso 2

- Quite el vendaje adhesivo al siguiente día y observe el sitio.
- Si observa enrojecimiento, dolor o calor en el sitio, llame a su cirujano.



Señales de advertencia

Cierre la abrazadera del tubo y llame a su cirujano si detecta:

- Ruido o zumbido en los oídos
- Visión nublada
- Sabor a metal en la boca
- Entumecimiento u hormigueo en los dedos de la mano, del pie o alrededor de la boca
- Somnolencia o confusión
- Aumento del dolor
- Fiebre, escalofríos, sudor
- Dificultad para respirar
- El sitio del tubo está enrojecido, hinchado, caliente o con dolor
- Hemorragia o secreción desde el sitio del tubo
- Se siente mareado o aturdido

Mire en línea en:

gwinnettmedicalcenter.nucleuslibrary.com

Este folleto tiene el propósito de complementar la información que usted recibe de su proveedor de salud. Esta información no debe ser considerada como consejo médico personal. Siempre comuníquese con su proveedor de atención médica en caso de tener preguntas o dudas.